



**Institut für Pathologie und  
Molekularpathologie**  
Schmelzbergstrasse 12  
8091 Zürich

www.pathologie.usz.ch

## BIOPSIE

Annahme Tel. 044 255 25 29 / 25 32  
Intern: Gegensprechanlage Nr. 2082  
Sekretariat Tel. 044 255 25 11  
pathologie@usz.ch

### Operationspräparate und Biopsien Intraoperative Schnellschnitte Gynäkologie

Datum der Entnahme: \_\_\_\_\_

#### Patient

Pat.-Nr \_\_\_\_\_

Fall-Nr \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Wohnort \_\_\_\_\_

Geb.-Datum \_\_\_\_\_

männlich  weiblich  unbekannt

Rechnung an  Patient  Auftraggeber

Andere: \_\_\_\_\_

Name und Adresse des **einsendenden Arztes/Spitals:**

Institution \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Befundkopie an:

Institution \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Schnellschnitt

Indikation: \_\_\_\_\_

Präzise Fragestellung: \_\_\_\_\_

Antwort an: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

**Organ/Entnahmeort:**

**Gewebe:**  frisch  fixiert

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

**Klinische Angaben / Diagnose / bisherige Therapie**

\_\_\_\_\_

Letzte Periode: \_\_\_\_\_ regelmässig  ja  nein durchschnittliche Zyklusdauer: \_\_\_\_\_

Hormonbehandlung: vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Oestrogen (welche?) \_\_\_\_\_  Gestagen (welche?) \_\_\_\_\_


**Fragestellung:**

\_\_\_\_\_

**Bemerkungen** (bei Studien auch Bezeichnung):

\_\_\_\_\_

Resektion



*bitte freilassen*

**wird von der Pathologie ausgefüllt:**

Ankunft fix  unfix   
aufg

Labor fix  aufg

BMA: \_\_\_\_\_

AA: \_\_\_\_\_

Datum, Zeit: \_\_\_\_\_

#### Schnellschnitt

Ankunft Labor: \_\_\_\_\_ Uhr

Bearbeitung (LaborantIn): \_\_\_\_\_

Beurteilung (PathologIn): \_\_\_\_\_


Diagnose: \_\_\_\_\_

Tel. Durchsage: \_\_\_\_\_ Uhr

Empfänger (OP): \_\_\_\_\_



# Resektion



## Markierung der Resektionsränder

zur Mamille: \_\_\_\_\_ medial: \_\_\_\_\_ lateral: \_\_\_\_\_

peripher: \_\_\_\_\_ cranial: \_\_\_\_\_

pectoral: \_\_\_\_\_ zur Haut: \_\_\_\_\_

### Standardisierte intraoperative Markierung von Mammapräparaten

Um die mammillo-periphere Achse (Ausrichtung der Milchgänge) standardisiert festzulegen, wird im UniversitätsSpital Zürich folgendes Markierungsschema verwendet:

Nach Seitenangabe der Brust wird die Achse (Zifferblatt) definiert. Die erste Fadenmarkierung erfolgt mamillennah mit 2 kurzen Fäden. Die zweite Markierung liegt hautnah mit 2 langen Fäden, gegebenenfalls wird sie durch eine exzidierte Hautspindel ersetzt. In der Regel ist durch diese Angaben ein Befund eindeutig lokalisiert. Eine Ausnahme bildet die retroareoläre Lage. Deswegen und zur besseren Identifizierung grösserer Gewebestücke empfiehlt sich eine dritte Markierung bei 12 Uhr mit einem langen Faden. Alle Markierungen werden auf dem Auftragsformular für die pathologische Untersuchung schriftlich festgehalten.

